

内科学講座糖尿病・代謝内科分野

氏名	所属	職名	取得学位	専門分野	主な論文・著作・業績
石垣 泰	内科学講座糖尿病・代謝内科分野	教授	医学博士	代謝学	<p>Ishigaki Y, Kono S, Katagiri H, Oka Y, Oikawa S; NTPP investigators. Elevation of HDL-C in Response to Statin Treatment is Involved in the Regression of Carotid Atherosclerosis. J Atheroscler Thromb. 2014 Jun 13.</p> <p>Gao J, Ishigaki Y, Yamada T, Kondo K, Yamaguchi S, Imai J, Uno K, Hasegawa Y, Sawada S, Ishihara H, Oyadomari S, Mori M, Oka Y, Katagiri H. Involvement of Endoplasmic Stress Protein C/EBP Homologous Protein in Arteriosclerosis Acceleration With Augmented Biological Stress Responses. Circulation. 2011;124(7):830-9.</p> <p>Ishigaki Y, Oka Y, Katagiri H. Circulating oxidized LDL: a biomarker and a pathogenic factor Curr Opin Lipidol. 2009; 20(5): 363-9.</p> <p>Ishigaki Y, Katagiri H, Gao J, Yamada T, Imai J, Uno K, Hasegawa Y, Kaneko K, Ogihara T, Ishihara H, Sato Y, Takikawa K, Nishimichi N, Matsuda H, Sawamura T, Oka Y. Impact of Plasma Oxidized LDL Removal on Atherosclerosis. Circulation. 118(1): 75-83, 2008.</p> <p>日本学術振興会科学研究費・基盤研究(C) 「課題名：動脈硬化形成における生体内ストレス応答調節機構の解明(代表)」2012年</p>
武部 典子	内科学講座糖尿病・代謝内科分野	講師	医学博士	代謝学・内分泌学	<p>Fujita N, Baba T, Tomiyama T, Kodama T, Kato N. Hyperinsulinaemia and blood pressure with insulinom. BMJ. 304(6835):1157(1992)</p> <p>武部典子、藤丸 潔、松原 潔、種市春仁、歳弘真貴子、吉成 仁、石田 弥、金子能人、澤田哲伸、佐々木正孝、佐藤俊一. 悪性貧血を合併した抗グルタミン酸脱炭酸酵素抗体陽性の緩徐進行型1型糖尿病の一例. 糖尿病. 43: 367-371(2000)</p> <p>Takebe N, Ishii M, Fujiwara F, Taneichi H, Toshihiro M, Yamashina M, Kajiwara T, Miura M, Ishida W, Takahashi K, Kaneko Y, Satoh J. Blood glucose fluctuation is an independent risk factor of coronary calcification in Japanese patients with type 2 diabetes. American Diabetes Association 67th Scientific Sessions; 2007; Chicago, USA.</p> <p>Takebe N, Takahashi T, Honma H, Kakino S, Yamashina M, Ishii M, Fujiwara F, Kajiwara T, Taneichi H, Miura M, Ishida W, Takahashi K, Kaneko Y, Satoh J. Blood glucose fluctuation is an independent predictor for plasma remnant-like lipoprotein particle-cholesterol level in patients with type 2 diabetes. the American Diabetes Association's 68th Scientific Sessions; 2008; San Francisco, USA.</p> <p>Takebe N, Masaya M, Nagasawa K, Takahashi T, Kakino S, Honma H, Yamashina M, Ishii M, Fujiwara F, Kajiwara T, Taneichi H, Takahashi K, Satoh J. Serum osteoprotegerin is related to coronary artery calcification, urinary albumin excretion, and diabetic retinopathy in Japanese patients with Type 2 diabetes. the 50th Annual Meeting of the European Association of Study for Diabetes; 2010; Stockholm, Sweden.</p>
高橋 義彦	内科学講座糖尿病・代謝内科分野	講師	医学博士	代謝学・内分泌学	<p>Oba S, Noda M, Waki K, Nanri A, Kato M, Takahashi Y, Poudel-Tandukar K, Matsushita Y, Inoue M, Mizoue T, Tsugane S; for the Japan Public Health Center-based Prospective Study Group. Smoking Cessation Increases Short-Term Risk of Type 2 Diabetes Irrespective of Weight Gain: The Japan Public Health Center-Based Prospective Study. PLoS One. 2012;7(2):e17061. Epub 2012 Feb 13.</p> <p>Tsujimoto T, Kajio H, Takahashi Y, Kishimoto M, Noto H, Yamamoto-Honda R, Kamimura M, Morooka M, Kubota K, Shimbo T, Hiroe M, Noda M. Asymptomatic coronary heart disease in patients with type 2 diabetes with vascular complications: a cross-sectional study. BMJ Open. 2011; 2:e000139.</p> <p>Isogawa A, Noda M, Takahashi Y, Kadowaki T, Tsugane S. Coffee consumption and risk of type 2 diabetes. Lancet 2003; 361:702-703.</p> <p>Takahashi Y, Noda M, Tsugane S, Kuzuya T, Ito C, Kadowaki T. Prevalence of diabetes estimated by plasma glucose criteria combined with standardized measurement of HbA1c among health checkup participants on Miyako Island, Japan. Diabetes Care 2000; 8: 1092-1096.</p> <p>Takahashi Y, Kadowaki H, Ando A, Quin JD, MacCuish AC, Yazaki Y, Akanuma Y, Kadowaki T. Two aberrant splicings caused by mutations in the insulin receptor gene in cultured lymphocytes from a patient with Rabson-Mendenhall's syndrome. J.Clin.Invest. 1998; 101: 588-594.</p>

内科学講座糖尿病・代謝内科分野

氏名	所属	職名	取得学位	専門分野	主な論文・著作・業績
種市 春仁	内科学講座糖尿病・代謝内科分野	特任講師	医学博士	代謝学(糖尿病)	Haruhito Taneichi, Takayoshi Sasai, Mio Ohara, Hiroyuki Honma, Kan Nagasawa, Toru Takahashi, Mototsugu Ishii, Fumikado Fujiwara, Mitsuhiro Yamashina, Takashi Kajiwara, Noriko Takabe, Kazuma Takahashi, Jo Satoh. Higher Serum Free Triiodothyronine Levels within the Normal Range are Associated with Metabolic Syndrome Components in Type 2 Diabetic Subjects with Euthyroidism Running Head: Free T3 and MetS components in diabetes. Tohoku Journal of Experimental Medicine, 224(3):173-8. 2011. 種市春仁, 石井基嗣, 高橋理論, 武部典子, 石田弥, 金子能人, 澤田哲伸, 千葉俊美, 鈴木一幸. プロタミン含有(NPH)インスリンにアレルギー反応を呈した糖尿病の2例. 岩手医学会誌. 54(5);401-405; 2002 種市春仁, 佐藤 讓. 糖尿病の血糖コントロールと治療薬. Medicament News;12-13;2009. 種市春仁, 金子能人, 佐藤讓. 作用機序の異なる3剤併用療法が奏功した2型糖尿病の2例. 治療学. 39(9);115-118; 2005. 種市春仁, 藤原史門, 佐藤讓. 肝硬変に伴う糖尿病. 糖尿病;51;203;2007.
梶原 隆	内科学講座糖尿病・代謝内科分野	助教		代謝学(糖尿病)	Kajiwara T, et al: Lower incidence of myocardial infarction in type 2 diabetic patients with polyneuropathy who were treated with an aldose reductase inhibitor (epalrestat): a retrospective study. 47th EASD Annual Meeting, Lisbon, 2011. 梶原 隆、他：エパルレストアットによる大血管障害発症抑制効果についての検討. 第53回日本糖尿病学会年次学術集会、岡山、2010.
本間 博之	内科学講座糖尿病・代謝内科分野	助教		代謝学(糖尿病)	Ohara M, Maesawa C, Takebe N, Takahashi T, Yamashina M, Ono M, Matsui M, Sasai T, Honma H, Nagasawa K, Fujiwara F, Kajiwara T, Taneichi H, Takahashi K, Satoh J: Different susceptibility to insulin resistance and fatty liver depending on the combination of TNF- C-857T and adiponectin G+276T gene polymorphisms in Japanese subjects with type 2 diabetes. Tohoku J Exp Med. 226(2):161-169, 2012.73. 藤田友嗣、本間博之、佐藤 讓、藤野靖久、小野寺誠、井上義博、遠藤重厚：中国製健康食品中のグリメピリドおよびロシグリタゾンの検出事例、中毒研究 24(1)：51-56、2011.
長澤 幹	内科学講座糖尿病・代謝内科分野	助教	医学博士	代謝学(糖尿病)	Nagasawa K, Kaneko Y, Taneichi H, Ishii M, Masaya M, Honma H, Kakino S, Takahashi K, Yoshioka Y, Satoh J: Association of decrease in liver triglyceride content with increase in plasma adiponectin levels after pioglitazone treatment in Japanese patients with type 2 diabetes. J Iwate Med Assoc 62(1): 59-66, 2010.
笹井 賢良	内科学講座糖尿病・代謝内科分野	助教	医学博士	代謝学(糖尿病)	Takayoshi Sasai, Noriko Takebe, Mitsutaka Ono, Mizue Matsui, Hiroyuki Honma, Fumikado Fujiwara, Takashi Kajiwara, Haruhito Taneichi, Kazuma Takahashi and Jo Satoh: Coronary artery calcification to assess coronary heart disease risk in Japanese patients with type2 diabetes. J Iwate Med Assoc 64(5): 2012, in press. 笹井賢良、他：日本人2型糖尿病患者における冠動脈石灰化スコアと冠動脈性心疾患の予後の関連. 第55回日本糖尿病学会年次学術集会(口演)、福岡、2012.